

probabilités conditionnelles

Table des matières

1 probabilités conditionnelle	2
1.1 activité	2
1.2 corrigés activités	3
1.3 à retenir	5
1.4 exercices	5
1.5 corrigés exercices	6
2 intersection, probabilité totale et arbres pondérés	8
2.1 activité	8
2.2 corrigés activités	9
2.3 à retenir	11
2.4 exercices	12
2.5 corrigés exercices	16
3 événements indépendants	21
3.1 activité	21
3.2 corrigé activité	22
3.3 à retenir	25
3.4 exercices	25
3.5 corrigés exercices	26
4 adéquation à une loi équirépartie	28
4.1 activité	28
4.2 corrigé activité	29
4.3 à retenir	31
4.4 exercices	32
4.5 correction exercices	34
5 devoir maison	38
6 évaluation	41
6.1 évaluation 1	42
6.2 corrigé évaluation 1	44

1 probabilités conditionnelle

1.1 activité

activité 1 :

un test est réalisé sur l'efficacité d'un vaccin.
1000 personnes participent au test.
les résultats sont résumés dans le tableau suivant

	vacciné	non vacciné	total
malade	120	180	300
non malade	480	220	700
total	600	400	1000

on choisit une personne au hasard parmi les 1000 personnes en supposant qu'il y a équiprobabilité

V signifie que "la personne a été vaccinée"

M signifie que "la personne est tombée malade"

- (a) i. calculer les probabilités $p(V)$ et $p(V \cap M)$ et interpréter les résultats
ii. calculer la probabilité qu'une personne soit tombée malade sachant qu'elle a été vaccinée notée $p_V(M)$
iii. comparer $p_V(M)$ et $\frac{p(V \cap M)}{p(V)}$
- (b) i. calculer les probabilités $p(\bar{V})$ et $p(\bar{V} \cap M)$ et interpréter les résultats
ii. calculer la probabilité qu'une personne soit tombée malade sachant qu'elle n'a pas été vaccinée notée $p_{\bar{V}}(M)$
iii. comparer $p_{\bar{V}}(M)$ et $\frac{p(\bar{V} \cap M)}{p(\bar{V})}$
- (c) est-il plus probable que la personne soit tombée malade sachant qu'elle a été vaccinée ou non ?
le vaccin semble-t-il efficace ?
- (d) calculer $p_M(V)$ par deux méthodes, en déduire $p_M(\bar{V})$ et interpréter ces résultats

activité 2 :

un dé à six faces n'est pas bien équilibré, un échantillonnage a permis d'obtenir le tableau suivant

score X	1	2	3	4	5	6	total
fréquence	0,1	0,2	0,1	0,4	0,1	0,1	1

avec ce dé, est-il plus probable de faire un score d'au moins 5 points si le score est pair ou s'il est impair ?

- calculer la probabilité que le score soit d'au moins 5 points sachant que le score est pair notée $p_{pair}(X \geq 5)$ en prenant pour définition $p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$
- calculer la probabilité que le score soit d'au moins 5 points sachant que le score est impair notée $p_{impair}(X \geq 5)$
- conclure
- calculer $p_{X \geq 5}(pair)$, $p_{X \geq 5}(impair)$ et interpréter ces résultats

1.2 corrigés activités

activité 1 :

un test est réalisé sur l'efficacité d'un vaccin.

1000 personnes participent au test.

les résultats sont résumés dans le tableau suivant

	vacciné	non vacciné	total
malade	120	180	300
non malade	480	220	700
total	600	400	1000

on choisit une personne au hasard parmi les 1000 personnes en supposant qu'il y a équiprobabilité

V signifie que "la personne a été vaccinée"

M signifie que "la personne est tombée malade"

(a) i. $p(V) = \frac{600}{1000} = 0,6 = \boxed{60\%}$ la probabilité que la personne soit vaccinée est 60%

$$p(V \cap M) = \frac{120}{1000} = 0,12 = \boxed{12\%}$$
 la probabilité qu'elle soit vaccinée et malade est 12%

ii. probabilité qu'une personne soit tombée malade sachant qu'elle a été vaccinée :

$$p_V(M) = \frac{120}{600} = 0,2 = \boxed{20\%}$$

iii. $p_V(M) = 20\%$ et $\frac{p(V \cap M)}{p(V)} = \frac{0,12}{0,6} = 0,2 = 20\%$ donc $\boxed{p_V(M) = \frac{p(V \cap M)}{p(V)}}$

(b) i. $p(\bar{V}) = 1 - p(V) = 1 - 0,6 = 0,4 = \boxed{40\%}$ la probabilité que la personne ne soit pas vaccinée est 40%

$$p(\bar{V} \cap M) = \frac{180}{1000} = 0,18 = \boxed{18\%}$$
 la probabilité qu'elle ne soit pas vaccinée et malade est 18%

ii. probabilité qu'une personne soit tombée malade sachant qu'elle n'a pas été vaccinée :

$$p_{\bar{V}}(M) = \frac{180}{400} = 0,45 = \boxed{45\%}$$

iii. $p_{\bar{V}}(M) = 45\%$ et $\frac{p(\bar{V} \cap M)}{p(\bar{V})} = \frac{0,18}{0,4} = 0,45 = 45\%$ donc $\boxed{p_{\bar{V}}(M) = \frac{p(\bar{V} \cap M)}{p(\bar{V})}}$

(c) $\boxed{\text{il est plus probable que la personne soit tombée malade sachant qu'elle n'a pas été vaccinée}}$

en effet : $p_{\bar{V}}(M) = 0,45$, $p_V(M) = 0,2$ et $0,45 > 0,2$ $\boxed{\text{le vaccin semble donc efficace}}$

(d) $p_M(V) = \frac{120}{300} = 0,4 = \boxed{40\%}$ ou $p_M(V) = \frac{p(M \cap V)}{p(M)} = \frac{0,12}{\frac{300}{1000}} = \frac{0,12}{0,3} = \boxed{40\%}$

donc $p_M(\bar{V}) = 1 - 0,4 = 0,6 = \boxed{60\%}$

interprétation :

$\boxed{\text{la probabilité que la personne soit vaccinée sachant quelle est tombée malade est 40\%}}$

$\boxed{\text{la probabilité que la personne ne soit pas vaccinée sachant quelle est tombée malade est 60\%}}$

activité 2 :

un dé à six faces n'est pas bien équilibré, un échantillonnage a permis d'obtenir le tableau suivant

score X	1	2	3	4	5	6	total
fréquence	0,1	0,2	0,1	0,4	0,1	0,1	1

avec ce dé, est-il plus probable de faire un score d'au moins 5 points si le score est pair ou s'il est impair ?

$$1. p_{\text{pair}}(X \geq 5) = \frac{p(6)}{p(2) + p(4) + p(6)} = \frac{p(\text{pair} \cap X \geq 5)}{p(\text{pair})} = \frac{0,1}{0,2 + 0,4 + 0,1} = \frac{0,1}{0,7} \simeq \boxed{14\%}$$

$$2. p_{\text{impair}}(X \geq 5) = \frac{p(\text{impair} \cap X \geq 5)}{p(\text{impair})} = \frac{p(5)}{p(1) + p(3) + p(5)} = \frac{0,1}{0,1 + 0,1 + 0,1} = \frac{0,1}{0,3} \simeq \boxed{33\%}$$

3. il est plus probable de faire un score d'au moins 5 points si le score est impair car $\boxed{33\% > 14\%}$

$$4. p_{X \geq 5}(\text{pair}) = \frac{p(\text{pair} \cap X \geq 5)}{p(X \geq 5)} = \frac{0,1}{0,1 + 0,1} = \frac{0,1}{0,2} = \frac{1}{2} = \boxed{50\%}$$

$$p_{X \geq 5}(\text{impair}) = 1 - 0,5 = \boxed{50\%}$$

interprétation :

$\boxed{\text{la probabilité de faire un score pair sachant que le score est d'au moins 5 points est } 50\%}$

$\boxed{\text{la probabilité de faire un score impair sachant que le score est d'au moins 5 points est } 50\%}$

1.3 à retenir

définition 1 :

Soit un univers de probabilité U sur lequel est défini une probabilité p

Soient $A \subset U$ et $B \subset U$ deux événements de U avec $B \neq \emptyset$

la probabilité de "A sachant B" est le nombre noté $p_B(A)$ tel que : $p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$

Remarques :

$$(a) p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{p(B \cap A)}{p(B)} \text{ car } B \cap A = A \cap B$$

propriété 1 : (cas de l'équiprobabilité)

Dans le cas de l'équiprobabilité (où chaque éventualité a la même probabilité) on a :

$$p_B(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables pour } A \cap B}{\text{nombre de cas favorables pour } B}$$

Justification :

en effet $p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$ et s'il y a équiprobabilité on a alors :

$$p_B(A) = \frac{\frac{\text{nombre de cas favorables pour } A \cap B}{\text{nombre de cas total}}}{\frac{\text{nombre de cas favorables pour } B}{\text{nombre de cas total}}} = \frac{\text{nombre de cas favorables pour } A \cap B}{\text{nombre de cas favorables pour } B}$$

1.4 exercices

exercice 1 :


une urne contient 12 billes numérotées, noires ou blanches.

on choisit une bille au hasard avec équiprobabilité.

on note B pour "blanche" et N pour "noire"

répondre aux questions grâce à un calcul de probabilité

- quel numéro est le plus probable ?
- quel numéro est le plus probable selon la couleur ?
- quelle couleur est la plus probable ?
- quelle couleur est la plus probable selon le numéro ?



exercice 2 :

on dispose des données suivantes concernant une classe

$$p(S \cap G) = 0,28; p(S \cap F) = 0,3; p(F) = 0,6$$

où S signifie "sportif", G signifie "garçons" et F signifie "fille"

- interpréter chacune des probabilités ci dessus
- calculer $p_G(S)$; $p_F(S)$ et interpréter
- calculer $p(S)$ et interpréter
- calculer $p_S(G)$; $p_S(F)$ et interpréter
- est-il plus probable de trouver un sportif parmi les filles ou parmi les garçons ?
- est-il plus probable de trouver un garçon ou bien une fille parmi les sportifs ?
- est-il plus probable de trouver un garçon sportif ou bien une fille sportive ?

1.5 corrigés exercices


corrigé exercice 1 :

une urne contient 12 billes numérotées, noires ou blanches.

on choisit une bille au hasard avec équiprobabilité.

on note B pour "blanche" et N pour "noire"

répondre aux questions grâce à un calcul de probabilité



i. $p(1) = p(2) = p(3) = \boxed{\frac{4}{12}}$

donc les numéros ont la même probabilité

ii. quel numéro est le plus probable selon la couleur ?

$$p_{\text{blanc}}(1) = \frac{1}{6} \quad p_{\text{blanc}}(2) = \frac{3}{6} \quad p_{\text{blanc}}(3) = \frac{2}{6} \quad \boxed{\text{sachant qu'il est blanc, le 2 est plus probable}}$$

$$p_{\text{noir}}(1) = \frac{3}{6} \quad p_{\text{noir}}(2) = \frac{1}{6} \quad p_{\text{noir}}(3) = \frac{2}{6} \quad \boxed{\text{sachant qu'il est noir, le 1 est plus probable}}$$

iii. quelle couleur est la plus probable ?

$$p(\text{blanc}) = p(\text{noir}) = \frac{6}{12} \quad \boxed{\text{les deux couleurs ont la même probabilité}}$$

iv. quelle couleur est la plus probable selon le numéro ?

$$p_1(\text{noir}) = \frac{3}{4} \quad \text{et} \quad p_1(\text{blanc}) = \frac{1}{4} \quad \boxed{\text{sachant que c'est 1, le noir est plus probable}}$$

$$p_2(\text{noir}) = \frac{1}{4} \quad \text{et} \quad p_2(\text{blanc}) = \frac{3}{4} \quad \boxed{\text{sachant que c'est 2, le blanc est plus probable}}$$

$$p_3(\text{noir}) = \frac{2}{4} \quad \text{et} \quad p_3(\text{blanc}) = \frac{2}{4}$$

$\boxed{\text{sachant que c'est 3, les deux couleurs ont la même probabilité}}$

corrigé exercice 2 :

on dispose des données suivantes concernant une classe

$$p(S \cap G) = 0,28; p(S \cap F) = 0,3; p(F) = 0,6$$

où S signifie "sportif", G signifie "garçons" et F signifie "fille"

i. interpréter chacune des probabilités ci dessus

$p(S \cap G) = 0,28$: la probabilité qu'un élève de cette classe soit "un garçon et sportif" est de 28%

$p(S \cap F) = 0,3$: la probabilité qu'un élève de cette classe soit "une fille et sportive" est de 30%

$p(F) = 0,6$: la probabilité qu'un élève de cette classe soit "une fille" est de 60%

ii. calculer $p_G(S)$; $p_F(S)$ et interpréter

$$p_G(S) = \frac{p(G \cap S)}{p(G)} = \frac{0,28}{1 - 0,6} = 0,7$$

sachant qu'il est garçon, la probabilité que l'élève soit sportif est de 70%

$$p_F(S) = \frac{p(F \cap S)}{p(F)} = \frac{0,30}{0,6} = 0,5$$

sachant que c'est une fille, la probabilité que l'élève soit sportive est de 50%

iii. calculer et $p(S)$ et interpréter

$$p(S) = p(S \cap G) + p(S \cap F) = 28\% + 30\% = 58\%$$

la probabilité qu'un élève de cette classe soit sportif est de 58%

iv. calculer $p_S(G)$; $p_S(F)$ et interpréter

$$p_S(G) = \frac{p(G \cap S)}{p(S)} = \frac{0,28}{0,58} \simeq 0,48$$

sachant qu'il est sportif, la probabilité que l'élève soit un garçon est d'environ 48%

$$p_S(F) = \frac{p(F \cap S)}{p(S)} = \frac{0,30}{0,58} \simeq 0,52$$

sachant que c'est une sportive, la probabilité que l'élève soit une fille est d'environ 52%

v. est-il plus probable de trouver un sportif parmi les filles ou parmi les garçons ?

$$\text{parmi les garçons} \text{ car } p_G(S) > p_F(S) \quad (0,7 > 0,5)$$

vi. est-il plus probable de trouver un garçon ou bien une fille parmi les sportifs ?

$$\text{une fille} \text{ car } p_S(G) < p_S(F) \quad (0,48 < 0,52)$$

vii. est-il plus probable de trouver un garçon sportif ou bien une fille sportive ?

$$\text{une fille sportive} \text{ car } p(S \cap G) < p(S \cap F) \quad (0,28 < 0,3)$$

2 intersection, probabilité totale et arbres pondérés


2.1 activité

activité 1

- (a) à partir de la définition de $p_B(A)$, démontrer que $p(A \cap B) = p(B) \times p_B(A)$
- (b) à partir de la définition de $p_A(B)$, démontrer que $p(A \cap B) = p(A) \times p_A(B)$
- (c) on sait qu'il y a 60% de garçons dans ce groupe dont 90% sont droitiers, de plus, 95% de filles sont droitiers
on choisit au hasard une des personnes de ce groupe, calculer les probabilités suivantes
 - i. la personne est un garçon droitier
 - ii. la personne est une fille droitiers
 - iii. la personne est droitiers
 - iv. la personne est un garçon sachant qu'elle est droitiers
 - v. la personne est une fille sachant qu'elle est droitiers

activité 2

- (a) un sondage est effectué sur une population de terminales après les résultats du bac
90% ont révisé sérieusement dont 80% ont eu le bac
30% de ceux qui n'ont pas révisé sérieusement ont eu le bac
on note B pour "a eu le bac" et R pour "a révisé sérieusement"
 - i. traduire les données ci dessus en termes de probabilités avec les notations mathématiques
 - ii. on organise les données dans l'arbre pondéré ci dessous
 - 1. compléter l'arbre des données numériques qui manquent



- 2. calculer $p(R \cap B)$ et $p(\bar{R} \cap B)$
- 3. en déduire $p(B)$ et $p(\bar{B})$
- 4. en déduire $p_{\bar{B}}(R)$ et $p_{\bar{B}}(\bar{R})$
- 5. pour cette population, est-il plus probable d'avoir le bac avec ou sans révision ?
- 6. interpréter les résultats de la question 4. (est-ce paradoxal ou non ?)


2.2 corrigés activités

corrigé activité 1

(a) $p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$ donc $p(A \cap B) = p(B) \times p_B(A)$ (produit en croix)

(b) $p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$ donc $p(A \cap B) = p(A) \times p_A(B)$ (produit en croix)

- (c) on sait qu'il y a 60% de garçons dans ce groupe dont 90% sont droitiers, de plus, 95% de filles sont droitiers
on choisit au hasard une des personnes de ce groupe, calculer les probabilités suivantes
on peut construire un arbre pondéré




- la personne est un garçon droitier : $p(G \cap D) = 0,54$
- la personne est une fille droitiers : $p(\bar{G} \cap D) = 0,38$
- la personne est droitiers $p(D) = p(G \cap D) + p(\bar{G} \cap D) = 0,54 + 0,38 = 0,92$
- la personne est un garçon sachant qu'elle est droitiers
$$p_D(G) = \frac{p(G \cap D)}{p(D)} = \frac{0,54}{0,92} \simeq 0,59$$
- la personne est une fille sachant qu'elle est droitiers
$$p_D(\bar{G}) = \frac{p(\bar{G} \cap D)}{p(D)} = \frac{0,38}{0,92} \simeq 0,41$$

corrigé activité 2

- (a) un sondage est effectué sur une population de terminales après les résultats du bac
 90% ont révisé sérieusement dont 80% ont eu le bac
 30% de ceux qui n'ont pas révisé sérieusement ont eu le bac
 on note B pour "a eu le bac" et R pour "a révisé sérieusement"

- i. traduire les données ci dessus en termes de probabilités avec les notations mathématiques
 ii. on organise les données dans l'arbre pondéré ci dessous
 1. compléter l'arbre des données numériques qui manquent



2. $p(R \cap B) = 0,72$ et $p(\bar{R} \cap B) = 0,18$

3. $p(B) = p(R \cap B) + p(\bar{R} \cap B) = 0,72 + 0,03 = 0,75$

$p(\bar{B}) = 1 - p(B) = 1 - 0,75 = 0,25$

4. $p_{\bar{B}}(R) = \frac{p(\bar{B} \cap R)}{p(\bar{B})} = \frac{0,18}{0,25} = 0,72$

$p_{\bar{B}}(\bar{R}) = 1 - p_{\bar{B}}(R) = 1 - 0,72 = 0,28$

5. pour cette population, est-il plus probable d'avoir le bac avec ou sans révision ?

avec révision, car $p_R(B) > p_{\bar{R}}(B)$ ($0,8 > 0,3$)

6. interpréter les résultats de la question 4. (est-ce paradoxal ou non ?)

La probabilité d'avoir révisé sachant que l'on n'a pas eu le bac de 72%

La probabilité de ne pas avoir révisé sachant que l'on n'a pas eu le bac de 28%

ce qui n'est pas paradoxal car on peut supposer que tous les élèves ont révisé

2.3 à retenir

propriété 2:

Soit un univers de probabilité U sur lequel est défini une probabilité p

Soient $A \subset U$ et $B \subset U$ deux événements de U

la probabilité de l'événement $A \cap B$ est telle que :

$$p(A \cap B) = p(A) \times p_B(A) \quad \text{et aussi} \quad p(A \cap B) = p(B) \times p_A(B)$$

Remarques :

(a) en général on a : $p(A \cap B) \neq p(A) \times p(B)$

(l'égalité sera vraie si et seulement si les événements A et B sont "indépendants", défini plus loin)


propriété 3: (probabilité totale)

Soit un univers de probabilité U sur lequel est défini une probabilité p

Soient $C \subset U$ et $D \subset U$ deux événements de U tels que $C \cup D = U$ et $C \cap D = \emptyset$
(on dit que C et D réalisent une partition de l'univers U)

la probabilité de l'événement A est telle que :

$$p(A) = p(A \cap C) + p(A \cap D) \quad \text{et aussi} \quad p(A) = p(C) \times p_C(A) + p(D) \times p_D(A)$$




Remarques :

(a) en particulier avec $D = \bar{C}$ on a : $p(A) = p(A \cap C) + p(A \cap \bar{C})$

(b) cette propriété se généralise pour une partition de U en trois, quatre ou n parties ou n est un entier naturel positif strict

(c) on visualise cette propriété avec l'arbre pondéré ci dessous



2.4 exercices

exercice 3 :

Une entreprise a équipé chacun de ses employés d'un seul ordinateur.

Pour le suivi de ses ordinateurs, l'entreprise fait appel à un même service de maintenance informatique.

Pour évaluer ce service, l'entreprise réalise une enquête et dispose ainsi, pour chaque employé, d'une fiche précisant la marque de son ordinateur et son avis sur le service de maintenance.

Il y a trois marques d'ordinateurs Aliet, Balart et Celt.

- 25 % des employés ont un ordinateur Aliet,
- 40 % des employés ont un ordinateur Balart,
- le reste des employés a un ordinateur Celt.

L'enquête a fourni les résultats suivants :

- parmi les employés équipés d'un ordinateur Aliet, 90 % sont satisfaits du service de maintenance,
- parmi les employés équipés d'un ordinateur Balart, 65 % sont satisfaits du service de maintenance,
- parmi les employés équipés d'un ordinateur Celt, 80 % sont satisfaits du service de maintenance.

On choisit au hasard la fiche d'un employé de l'entreprise, chacune ayant la même probabilité d'être choisie.

On note :

- A l'évènement : « La fiche choisie est celle d'un employé équipé d'un ordinateur Aliet »,
- B l'évènement : « La fiche choisie est celle d'un employé équipé d'un ordinateur Balart »,
- C l'évènement : « La fiche choisie est celle d'un employé équipé d'un ordinateur Celt »,
- S l'évènement : « La fiche choisie est celle d'un employé satisfait du service de maintenance ».

- (a) Construire un arbre pondéré décrivant la situation.
- (b) Calculer la probabilité que la fiche choisie soit celle d'un employé équipé d'un ordinateur Aliet et satisfait du service de maintenance.
- (c) Démontrer que la probabilité que la fiche choisie soit celle d'un employé satisfait du service de maintenance est 0,765.
- (d) Sachant que la fiche choisie est celle d'un employé satisfait du service de maintenance, calculer la probabilité que cet employé soit équipé d'un ordinateur de la marque Celt.

Le résultat sera arrondi à 10^{-3} .

exercice 4 :

On s'intéresse à la population des personnes âgées de plus de 65 ans d'un certain pays en 2006.

Dans cette population :

- 58 % sont des femmes ;
- 5 % des personnes sont atteintes d'une maladie incurable appelée maladie A et parmi celles-ci les deux tiers sont des femmes.

On choisit au hasard une personne dans cette population.

On note :

- F l'évènement : « la personne choisie est une femme » ;
- H l'évènement : « la personne choisie est un homme » ;
- A l'évènement : « la personne choisie est atteinte de la maladie A » ;
- \overline{A} l'évènement : « la personne choisie n'est pas atteinte de la maladie A ».

Les résultats seront arrondis au millième.

- (a) i. Donner la probabilité de l'évènement F et celle de l'évènement A .
Donner la probabilité de l'évènement F sachant que l'évènement A est réalisé, notée $p_A(F)$.
ii. Définir par une phrase l'évènement $A \cap F$ puis calculer sa probabilité.
iii. Montrer que la probabilité de l'évènement A sachant que F est réalisé est égale à 0,057 à 10^{-3} près.
- (b) La personne choisie est un homme. Démontrer que la probabilité que cet homme soit atteint de la maladie A est égale à 0,040 à 10^{-3} près.
- (c) Peut-on affirmer que, dans ce pays en 2006, dans la population des personnes âgées de plus de 65 ans, une femme risquait davantage de développer la maladie A qu'un homme ? Justifier.

exercice 5 :

(D'après sujet bac Polynésie Septembre 2010)

« Un geste qui sauve : en France, chaque année, 55 000 personnes sont victimes d'un accident cardio-vasculaire. Sept fois sur dix, ces accidents surviennent devant témoin. » (Source : TNS / Fédération Française de Cardiologie, 2009).

En 2009, environ 36 % de la population française a appris à accomplir les gestes qui sauvent.

partie 1

Lors d'un accident cardio-vasculaire devant témoins, on admet que la proportion de témoins formés aux gestes qui sauvent suit la proportion nationale.

La probabilité qu'un accident cardio-vasculaire se produise devant un témoin formé aux gestes qui sauvent est de 0,25.

Lorsque l'accident cardio-vasculaire s'est produit devant un témoin formé aux gestes qui sauvent, la probabilité que le malade survive est 0,1.

Sinon, la probabilité que le malade survive est de 0,007.

On appelle T l'évènement : « L'arrêt cardiaque s'est produit devant un témoin formé aux gestes qui sauvent ».

On appelle S l'évènement : « Le malade survit à l'arrêt cardiaque ».

On appelle \bar{T} et \bar{S} les évènements contraires à T et à S .

RAPPEL DE NOTATION : Si A et B sont deux évènements donnés, $p(A)$ désigne la probabilité que l'évènement A se réalise et $p_B(A)$ désigne la probabilité de l'évènement A sachant que l'évènement B est réalisé.

On pourra s'aider d'un arbre pondéré. Les résultats seront arrondis au centième.

- (a) Déterminer, d'après l'énoncé, $p(T)$, $p_T(S)$ et $p_{\bar{T}}(S)$.
- (b) En déduire $p(T \cap S)$.
- (c) Vérifier que la valeur arrondie au centième de $p(S)$ est 0,03.
- (d) Interpréter ces deux derniers résultats.
- (e) Justifier que le nombre de victimes d'accidents cardiaques survivant à cet accident peut s'estimer à environ 1 650.

partie 2

Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.

En 2015 tous les lieux publics (stades, centres commerciaux, ...) seront équipés en défibrillateurs. Par ailleurs, un sondage montre qu'environ 71 % de la population souhaite se former à accomplir les gestes qui sauvent. Si ce taux de formation est atteint :

- la probabilité que l'accident cardiaque survienne devant un témoin formé aux gestes qui sauvent serait de 0,5 ;
- la probabilité de survie en cas d'intervention d'un témoin formé aux gestes qui sauvent serait augmentée à 0,25 et 0,046 sinon.

Déterminer combien de vies supplémentaires pourraient être sauvées si ces conditions étaient satisfaites.

exercice 6 :

(D'après sujet bac France Métropolitaine Septembre 2009)

Dans un lycée général et technologique, il y a 1400 lycéens : des élèves de seconde, première ou terminale, et des étudiants en section de technicien supérieur (STS).

Pour pouvoir disposer des collections de manuels scolaires, tous les lycéens doivent adhérer à la coopérative scolaire et payer une location annuelle d'un montant de 50 euros pour les élèves et 60 euros pour les étudiants.

Sur l'ensemble des adhérents à la coopérative scolaire, 62,5 % sont les élèves de seconde, première ou terminale. Les autres sont les étudiants de STS.

Depuis quelques années, les élèves de seconde, première ou terminale disposent de chèques-lire avec lesquels ils peuvent régler cette location :

- 40 % paient leur location à l'aide de chèques-lire,
- 56 % paient par chèque bancaire,
- les autres paient par mandat ou en liquide.

Les étudiants de STS ne disposent pas de chèques-lire :

- 96 % paient par chèque bancaire,
- les autres paient par mandat ou en liquide.

Les parties I et II sont indépendantes

partie i

Les 1400 lycéens, élèves comme étudiants, adhèrent à cette coopérative.

- (a) Calculer le montant des versements effectués par chèque bancaire.
- (b) Calculer le pourcentage du montant total des locations que cette somme représente.

partie ii

On prend au hasard la fiche d'un adhérent à la coopérative scolaire parmi les 1400 fiches.

On note :

- L l'évènement « l'adhérent est un élève » ;
- E l'évènement « l'adhérent est un étudiant en STS » ;
- C l'évènement « l'adhérent paie avec ses chèques-lire » ;
- B l'évènement « l'adhérent paie avec un chèque bancaire » ;
- A l'évènement « l'adhérent paie par un autre moyen de paiement ».

- (a) Traduire à l'aide d'un arbre pondéré la situation décrite ci-dessus.
- (b)
 - i. Calculer la probabilité que l'adhérent soit un élève ayant payé sa location à l'aide de chèques-lire.
 - ii. Calculer la probabilité que l'adhérent soit un étudiant en STS ayant payé sa location à l'aide d'un chèque bancaire.
 - iii. Démontrer que la probabilité que l'adhérent ait payé par chèque bancaire est de 0,71.
- (c) Un adhérent a payé par chèque bancaire. Calculer la probabilité que ce soit un élève.

exercice 7: (53 bis p 185)

Dans une entreprise, un gestionnaire de stock a constaté que pour un certain produit :
si le produit a été approvisionné une semaine alors la probabilité qu'il faille approvisionner la semaine suivante est de 0,1
si le produit n'a pas été approvisionné une semaine alors la probabilité qu'il faille approvisionner la semaine suivante est de 0,6
il a fallu approvisionner la première semaine

Soit A_n l'événement : " le produit a été approvisionné la n^{ieme} semaine
on note $p_n = p(A_n)$

1. (a) construire un arbre pondéré
(b) montrer que $p_{n+1} = -0,5p_n + 0,6$
(c) donner la valeur de p_1
(d) préciser la nature de la suite (p_n)
2. soit la suite u telle que $u_n = p_n - 0,4$
 - (a) démontrer que u est géométrique et préciser sa raison et son premier terme
 - (b) exprimer u_n en fonction de n et en déduire p_n en fonction de n
 - (c) compléter le tableau de valeurs suivant à 0,01 près et interpréter la valeur de p_3

n	1	2	3	4	5	6	7
p_n							
 - (d) la propriété vue sur la limite de q^n peut-elle servir à déterminer la limite éventuelle de la suite (p_n) ?
 - (e) conjecturer la valeur de la limite éventuelle de la suite (p_n) et interpréter le résultat

exercice 8:


dans une fête foraine, un stand propose le jeu suivant :
une urne contient 50 billes noires et 100 blanches
une personne tire deux billes au hasard l'une après l'autre sans remise avec équiprobabilité.
"c'est gagné" si les deux billes sont de couleurs différentes

1. (a) construire un arbre pondéré
(b) montrer que la probabilité de gagner est d'environ 0,447
2. l'organisateur se rend compte que la probabilité de gagner est trop grande et décide d'ajouter x billes noires afin que la probabilité de gagner soit la plus proche possible de 0,2
 - (a) construire un arbre pondéré
 - (b) montrer que la probabilité de gagner est $p(x) = \frac{150x + 10000}{(x + 150)(x + 149)}$
 - (c) utiliser la calculatrice pour déterminer la valeur de x cherchée
 - (d) un logiciel de calcul formel permet d'obtenir que $p'(x) = \frac{50(-3x^2 - 400x + 7250)}{(x + 150)^2(x + 149)^2}$
 - i. en déduire le tableau de variations de p sur $[0; +\infty[$
 - ii. en déduire la valeur de x pour laquelle la probabilité est maximale et donner cette probabilité

2.5 corrigés exercices

corrigé exercice 3 :

(a) arbre pondéré décrivant la situation.



(b) probabilité que la fiche choisie soit celle d'un employé équipé d'un ordinateur Aliet et satisfait du service de maintenance.

$$p(A \cap S) = p(A) \times p_A(S) = 0,25 \times 0,9 = 0,225$$


(c) probabilité que la fiche choisie soit celle d'un employé satisfait du service de maintenance

$$p(S) = p(A \cap S) + p(B \cap S) + p(C \cap S) = 0,25 \times 0,9 + 0,4 \times 0,65 + 0,35 \times 0,8 = 0,765$$

(d) Sachant que la fiche choisie est celle d'un employé satisfait du service de maintenance, probabilité que cet employé soit équipé d'un ordinateur de la marque Celt.

$$p_S(C) = \frac{p(S \cap C)}{p(S)} = \frac{0,35 \times 0,8}{0,765} \approx 0,36$$

corrigé exercice 4 :



(a)

i. $p(F) = 0,58$ et $p(A) = 0,05$

$$p_A(F) = \frac{2}{3}$$

ii. probabilité que la personne soit atteinte de la maladie A et qu'elle soit une femme

$$p(A \cap F) = 0,05 \times \frac{2}{3} \approx 0,033$$

iii. $p_F(A) = \frac{p(A \cap F)}{p(F)} = \frac{0,05 \times \frac{2}{3}}{0,58} \approx 0,057$


(b) $p_H(A) = \frac{p(A \cap H)}{p(H)} = \frac{0,05 \times \frac{1}{3}}{1 - 0,58} \approx 0,040$

(c) dans ce pays en 2006, dans la population des personnes âgées de plus de 65 ans, une femme risquait davantage de développer la maladie A qu'un homme :

car $p_H(A) < p_F(A)$ ($0,04 < 0,057$)

corrigé exercice 5 :

partie 1



(a) d'après l'énoncé :

$$p(T) = 0,25$$

$$p_T(S) = 0,1$$

$$p_{\bar{T}}(S) = 0,07$$

(b) $p(T \cap S) = p(T) \times p_T(S) = 0,25 \times 0,1 = 0,025$

(c) $p(S) = p(T \cap S) + p(\bar{T} \cap S) = 0,25 \times 0,1 + 0,75 \times 0,07 = 0,03025 \approx 0,03$

(d) $p(T \cap S) = 0,025$:

la probabilité de l'évènement : « L'arrêt cardiaque s'est produit devant un témoin formé

aux gestes qui sauvent et la personne survit » est de 2,5%

$$p(S) = 0,03 :$$

la probabilité de l'évènement : « la personne atteinte de l'attaque cardiaque survie » est de $\simeq 3\%$


(e) $55000 \times 0,03 = 1650$

partie 2

on a :

corrigé exercice 6 :

partie i



- (a) montant des versements effectués par chèque bancaire :

montant total effectués par chèque bancaire =
montant pour les élèves + montant pour les étudiants

montant total effectués par chèque bancaire =
nb élèves \times prix par élève + nb étudiants \times prix par étudiant

$$\text{montant total effectués par chèque bancaire} = 1400 \times 0,625 \times 0,56 \times 50 + 1400 \times 0,375 \times 0,96 \times 60 = \boxed{54740} \text{ €}$$

- (b) pourcentage du montant total des locations que cette somme représente.

montant des versements effectués :

montant total = montant pour les élèves + montant pour les étudiants

$$p(T) = 0,5$$

$$p_T(S) = 0,25$$

$$p_{\overline{T}}(S) = 0,046$$

avec :

$$p(S) = p(T \cap S) + p(\overline{T} \cap S)$$

$$p(S) = p(T) \times p_T(S) + p(\overline{T}) \times p_{\overline{T}}(S)$$

on a :

$$p(S) = 0,5 \times 0,25 + (1 - 0,5) \times 0,046 = \boxed{0,148}$$

$$\text{nombre de personnes à survivre} = 0,148 \times 55000 = \boxed{8140}$$

$$\text{nombre de vies supplémentaires sauvées} : 8140 - 1650 = \boxed{6490}$$

montant total = nombre d'élèves \times prix par élève + nombre d'étudiants \times prix par étudiant

$$\text{montant total} = 1400 \times 0,625 \times 50 + 1400 \times 0,375 \times 60 = \boxed{75250} \text{ €}$$

$$\text{pourcentage} = \frac{54740}{75250} \simeq \boxed{73\%}$$

partie ii

- (a) arbre pondéré ci dessus

- (b) i. probabilité que l'adhérent soit un élève ayant payé sa location à l'aide de chèques-lire

$$p(L \cap C) = p(L) \times p_L(C) = 0,625 \times 0,4 = \boxed{0,25}$$

- ii. probabilité que l'adhérent soit un étudiant en STS ayant payé sa location à l'aide d'un chèque bancaire

$$p(E \cap B) = p(E) \times p_E(B) = 0,375 \times 0,96 = \boxed{0,36}$$

- iii. la probabilité que l'adhérent ait payé par chèque bancaire est de 0,71 car

$$p(B) = p(L \cap B) + p(E \cap B) = 0,625 \times 0,56 + 0,35 = \boxed{0,71}$$

- (c) Un adhérent a payé par chèque bancaire. probabilité que ce soit un élève.

$$p_B(L) = \frac{p(B \cap L)}{p(B)} = \frac{0,625 \times 0,56}{0,71} \simeq \boxed{0,49}$$

corrigé exercice 7 : (53 bis p 185)


Dans une entreprise, un gestionnaire de stock a constaté que pour un certain produit :
 si le produit a été approvisionné une semaine alors la probabilité qu'il faille approvisionner la semaine suivante est de 0,1

si le produit n'a pas été approvisionné une semaine alors la probabilité qu'il faille approvisionner la semaine suivante est de 0,6

il a fallu approvisionner la première semaine

Soit A_n l'événement : " le produit a été approvisionné la $n^{ième}$ semaine
 on note $p_n = p(A_n)$

1. (a) construire un arbre pondéré



(b) montrer que $p_{n+1} = -0,5p_n + 0,6$

$$p(A_{n+1}) = p(A_n \cap A_{n+1}) + p(\overline{A_n} \cap A_{n+1})$$

$$p(A_{n+1}) = p_n \times 0,1 + (1 - p_n) \times 0,6$$

$$p(A_{n+1}) = p_n \times 0,1 + 0,6 - 0,6p_n$$

$$\boxed{p_{n+1} = -0,5p_n + 0,6}$$

(c) il a fallu approvisionner la première semaine donc $\boxed{p_1 = 1}$

(d) (p_n) est $\boxed{\text{arithmético-géométrique}}$

2. soit la suite u telle que $u_n = p_n - 0,4$

(a) démontrer que u est géométrique et préciser sa raison et son premier terme

$$\text{à partir de : } \begin{cases} (1) u_n = p_n - 0,4 \implies (2) u_{n+1} = p_{n+1} - 0,4 \\ (3) p_{n+1} = -0,5p_n - 0,4 \end{cases}$$

Montrons que $p_{n+1} = -0,5p_n$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{p_{n+1} - 0,4}{p_n - 0,4} \quad (1) \text{ et } (2)$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(-0,5p_n + 0,6) - 0,4}{p_n - 0,4} \quad (3)$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{-0,5p_n + 0,2}{p_n - 0,4}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{-0,5(p_n + \frac{0,2}{-0,5})}{p_n - 0,4} \quad (-0,5 \text{ en facteur})$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{-0,5(p_n - 0,4)}{p_n - 0,4}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = -0,5 \text{ C.Q.F.D.}$$

donc (u_n) est géométrique de raison $q = -0,5$
 et de premier terme $u_0 = p_0 - 0,4 = 1 - 0,4 = \span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px;">0,6$

(b) exprimer u_n en fonction de n et en déduire p_n en fonction de n

$$u_n = u_1 \times q^{n-1} = 0,6 \times (-0,5)^{n-1}$$

$$\span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px;"> $p_n = 0,4 + 0,6 \times (-0,5)^{n-1}$
 on vérifie que $p_1 = 0,4 + 0,6 \times (-0,5)^{1-1} = 1$$$

(c) compléter le tableau de valeurs suivant à 0,01 près et interpréter la valeur de p_3

n	1	2	3	4	5	6	7
p_n	1	0,4	0,7	0,55	0,625	0,5875	0,60625

(d) la propriété vue sur la limite de q^n peut-elle servir à déterminer la limite éventuelle de la suite (p_n) ?

non car q n'est pas compris entre 0 et 1 ou n'est pas supérieur strict à 1 ou n'est pas égal à 1

(e) conjecturer la valeur de la limite éventuelle de la suite (p_n) et interpréter le résultat :

le tableau de valeurs de la suite laisse penser que $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 0,6$

ce qui signifie qu'à long terme, la probabilité qu'il y ait un approvisionnement se rapproche de 60%


corrigé exercice 8 :

dans une fête foraine, un stand propose le jeu suivant :

une urne contient 50 billes noires et 100 blanches

une personne tire deux billes au hasard l'une après l'autre sans remise avec équiprobabilité.

"c'est gagné" si les deux billes sont de couleurs différentes



(b) montrer que la probabilité de gagner est d'environ 0,447

$$p(G) = p(N_1 \cap \overline{N_2}) + p(\overline{N_1} \cap N_2)$$

$$p(G) = \frac{50}{150} \times \frac{100}{149} + \frac{100}{150} \times \frac{49}{149}$$

$$p(G) \simeq 0,447$$

2. l'organisateur se rend compte que la probabilité de gagner est trop grande et décide d'ajouter x billes noires afin que la probabilité de gagner soit la plus proche possible de 0,2

(a) construire un arbre pondéré

(b) montrer que la probabilité de gagner est $p(x) = \frac{150x + 10000}{(x + 150)(x + 149)}$

(c) utiliser la calculatrice pour déterminer la valeur de x cherchée

(d) un logiciel de calcul formel permet d'obtenir que $p'(x) = \frac{50(-3x^2 - 400x + 7250)}{(x + 150)^2(x + 149)^2}$

i. en déduire le tableau de variations de p sur $[0; +\infty[$

ii. en déduire la valeur de x pour laquelle la probabilité est maximale et donner cette probabilité

3 événements indépendants

3.1 activité

activité 1

on dispose des informations suivantes sur les élèves d'un lycée

	porte des lunettes	ne porte pas de lunette	total
fille	150	450	600
garçon	100	300	400
total	250	750	1000

on choisit un élève au hasard parmi les 1000 en supposant qu'il y a équiprobabilité

L signifie que "l'élève porte des lunettes"

F signifie que "l'élève est une fille " et G "un garçon"

- On cherche à savoir si les événements "fille" et "lunette" sont indépendants

i. méthode 1 :

calculer les probabilités $p(L)$ et $p_F(L)$

d'après ce résultat, le fait d'être une fille influe-t-il sur la probabilité de porter des lunettes ?

si $p(L) = p_F(L)$ alors F et L sont indépendants, que conclure pour F et L ?

ii. méthode 2 :

calculer les probabilités $p(F)$ et $p_L(F)$

d'après ce résultat, le fait de porter des lunettes influe-t-il sur la probabilité d'être une fille ?

si $p(F) = p_L(F)$ alors F et L sont indépendants, que conclure pour F et L ?

iii. méthode 3 :

1. $A \neq \emptyset$ et $B \neq \emptyset$ deux événements, montrer que : si $p_A(B) = p(B)$ alors $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$

2. $A \neq \emptyset$ et $B \neq \emptyset$ deux événements, montrer que : si $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$ alors $p_A(B) = p(B)$

3. calculer les probabilités $p(F)$, $p(L)$ et $p(L \cap F)$

calculer $p(F) \times p(L)$

si $p(F) \times p(L) = p(F \cap L)$ alors F et L sont indépendants, que conclure pour F et L ?

- déterminer si G et L sont indépendants puis incompatibles
- déterminer si G et F sont indépendants

activité 2

un dé à 8 faces n'est pas bien équilibré, un échantillonnage a permis d'obtenir le tableau suivant

score X	1	2	3	4	5	6	7	8	total
fréquence	0,05	0,1	0,05	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	1

i. les événements "pair" et " $X \leq 4$ " sont-ils indépendants ? incompatibles ?

ii. les événements " $X \geq 4$ " et " $X \leq 4$ " sont-ils indépendants ? incompatibles ?

3.2 corrigé activité

corrigé activité 1

on dispose des informations suivantes sur les élèves d'un lycée

	porte des lunettes	ne porte pas de lunette	total
filles	150	450	600
garçon	100	300	400
total	250	750	1000

on choisit un élève au hasard parmi les 1000 en supposant qu'il y a équiprobabilité

L signifie que "l'élève porte des lunettes"

F signifie que "l'élève est une fille" et G "un garçon"

- On cherche à savoir si les événements "filles" et "lunette" sont indépendants

i. méthode 1 :

$$p(L) = \frac{250}{1000} = 25\% \quad \text{et} \quad p_F(L) = \frac{150}{600} = 25\%$$

d'après ce résultat, le fait d'être une fille ne semble pas influencer la probabilité de porter des lunettes

si $p(L) = p_F(L)$ alors F et L sont indépendants, que conclure pour F et L ?

$$p(L) = p_F(L) = 25\% \quad \text{donc} \quad F \text{ et } L \text{ sont indépendants}$$

ii. méthode 2 :

$$p(F) = \frac{600}{1000} = 60\% \quad \text{et} \quad p_L(F) = \frac{150}{250} = 60\%$$

d'après ce résultat, le fait de porter des lunettes ne semble pas influencer la probabilité d'être une fille

si $p(F) = p_L(F)$ alors F et L sont indépendants, que conclure pour F et L ?

$$p(F) = p_L(F) = 60\% \quad \text{donc} \quad F \text{ et } L \text{ sont indépendants}$$

iii. méthode 3 :

1. $A \neq \emptyset$ et $B \neq \emptyset$ deux événements, montrer que : si $p_A(B) = p(B)$ alors $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$

on sait que : $p(A \cap B) = p(A) \times p_A(B)$ (cours)

si de plus : $p_A(B) = p(B)$

alors : $p(A \cap B) = p(B) \times p(A)$

2. $A \neq \emptyset$ et $B \neq \emptyset$ deux événements, montrer que : si $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$ alors $p_A(B) = p(B)$

on sait que : $p(A \cap B) = p(B) \times p_B(A)$ (cours)

si de plus : $p_B(A) = p(A)$

alors : $p(A \cap B) = p(B) \times p(A)$

3. calculer les probabilités $p(F)$, $p(L)$ et $p(L \cap F)$

$$p(F) = \frac{600}{1000} = 60\%$$

$$p(L) = \frac{250}{1000} = 25\%$$

$$p(L \cap F) = \frac{150}{1000} = 15\%$$

on a : $p(F) \times p(L) = 0,6 \times 0,25 = 0,15 = 15\%$

donc : $p(F) \times p(L) = p(L \cap F)$ donc F et L sont indépendants

- déterminer si G et L sont indépendants puis incompatibles

$$p(G) = \frac{400}{1000} = 40\%$$

$$p(L) = \frac{250}{1000} = 25\%$$


$$p(L \cap G) = \frac{100}{1000} = 10\%$$

on a : $p(G) \times p(L) = 0,4 \times 0,25 = 0,1 = 10\%$

donc : $p(G) \times p(L) = p(G \cap L)$ donc G et L sont indépendants


G et L ne sont pas incompatibles car $G \cap L \neq \emptyset$

A et B non incompatibles



car $A \cap B \neq \emptyset$

A et B incompatibles



car $A \cap B = \emptyset$

- déterminer si G et F sont indépendants

$$p(G) = \frac{400}{1000} = 40\%$$

$$p(F) = \frac{600}{1000} = 60\%$$

$$p(G \cap F) = \frac{0}{1000} = 0\%$$

on a : $p(G) \times p(F) = 0,4 \times 0,6 = 0,24 = 24\%$

donc : $p(G) \times p(F) \neq p(G \cap F)$ donc G et F ne sont pas indépendants

de plus

G et F sont incompatibles car $G \cap F = \emptyset$

corrigé activité 2

un dé à 8 faces n'est pas bien équilibré, un échantillonnage a permis d'obtenir le tableau suivant

score X	1	2	3	4	5	6	7	8	total
fréquence	0,05	0,1	0,05	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	1

- i. les événements "pair" et " $X \leq 4$ " sont-ils indépendants ? incompatibles ?

$$p(X_{\text{pair}}) = p(X = 2) + p(X = 4) + p(X = 6) = 0,1 + 0,2 + 0,3 = 0,6$$

$$p(X \leq 4) = p(X = 1) + p(X = 2) + p(X = 3) + p(X = 4) = 0,05 + 0,1 + 0,05 + 0,2 = 0,4$$

$$p(X_{\text{pair}} \cap X \leq 4) = p(X = 2) + p(X = 4) = 0,1 + 0,2 = 0,3$$

on a : $p(X_{\text{pair}}) \times p(X \leq 4) = 0,6 \times 0,4 = 0,24$

donc : $p(X_{\text{pair}}) \times p(X \leq 4) \neq p(X_{\text{pair}} \cap X \leq 4)$ donc X_{pair} et $X \leq 4$ ne sont pas indépendants

de plus

X_{pair} et $X \leq 4$ ne sont pas incompatibles car $X_{\text{pair}} \cap X \leq 4 \neq \emptyset$

ii. les événements " $X \geq 4$ " et " $X \leq 4$ " sont-ils indépendants ? incompatibles ?

$$p(X \leq 4) = 0,4$$

$$p_{X \geq 4}(X \leq 4) = \frac{p(X \geq 4 \cap X \leq 4)}{p(X \geq 4)} = \frac{0,2}{0,2 + 0,1 + 0,3 + 0,1 + 0,1} = \frac{0,2}{0,8} = 0,25$$

$p(X \leq 4) \neq p_{X \geq 4}(X \leq 4)$ donc " $X \geq 4$ " et " $X \leq 4$ " ne sont pas indépendants

de plus

$X \geq 4$ et $X \leq 4$ ne sont pas incompatibles car $X \geq 4 \cap X \leq 4 \neq \emptyset$

3.3 à retenir

propriété 4: (indépendance)

Soit un univers de probabilité U sur lequel est défini une probabilité p

Soient $A \subset U$ et $B \subset U$ deux événements de U

$$A \text{ et } B \text{ sont indépendants} \iff p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$$

$$A \text{ et } B \text{ sont indépendants} \iff p_B(A) = p(A)$$

$$A \text{ et } B \text{ sont indépendants} \iff p_A(B) = p(B)$$

Remarques :

- (a) A et B sont incompatibles $\iff A \cap B = \emptyset$
- (b) "indépendants" n'est pas équivalent à "incompatibles"

3.4 exercices

exercice 9:

Une entreprise réalise et commercialise des compositions florales ainsi que des produits pour le jardin. L'entreprise confectionne ses compositions florales avec des bulbes de fleurs qu'elle reçoit en grande quantité. Chaque bulbe peut présenter deux défauts que l'on désigne par défaut a et défaut b .

On prélève un bulbe au hasard dans un stock important.

On note A l'évènement : « le bulbe présente le défaut a » et on note B l'évènement : « le bulbe présente le défaut b ».

On admet que les probabilités des évènements A et B sont $P(A) = 0,015$ et $P(B) = 0,02$.

On suppose que les deux évènements A et B sont indépendants

On admettra que si A et B sont indépendants alors A, B, \bar{A}, \bar{B} sont indépendants deux à deux

- i. Calculer la probabilité de l'évènement E_1 : « le bulbe présente le défaut a et le défaut b ».
- ii. Calculer la probabilité de l'évènement E_2 : « le bulbe présente au moins un des deux défauts ».
- iii. Calculer la probabilité de l'évènement E_3 : « le bulbe ne présente aucun des deux défauts ».
- iv. Calculer la probabilité de l'évènement E_4 : « le bulbe présente exactement un des deux défauts ».
- v. que vaut $p(E_1) + p(E_3) + p(E_4)$?

exercice 10:

(D'après sujet bac France Métropolitaine, La Réunion Septembre 2007)

Jean s'amuse régulièrement sur un terrain de football avec le gardien de but. Chaque partie consiste à tirer successivement deux tirs au but.

Au vu des résultats obtenus au cours de l'année, on admet que :

- la probabilité que Jean réussisse le premier tir au but est égal à 0,8 ;
- s'il réussit le premier, alors la probabilité de réussir le second est 0,7 ;
- s'il manque le premier, alors la probabilité de réussir le second est 0,5.

On note R_1 l'évènement : « le premier tir au but est réussi » et \bar{R}_1 son évènement contraire, R_2 l'évènement : « le second tir au but est réussi » et \bar{R}_2 son évènement contraire.

- (a) Représenter la situation par un arbre pondéré.
- (b) Calculer la probabilité que les deux tirs au but soient réussis.
- (c) i. Calculer la probabilité que le second tir au but soit réussi.
ii. Les évènements R_1 et R_2 sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.
- (d) On note A l'évènement : « Jean a réussi exactement un tir au but ». Montrer que $p(A) = 0,34$.

3.5 corrigés exercices

corrigé exercice 9 :

Une entreprise réalise et commercialise des compositions florales ainsi que des produits pour le jardin. L'entreprise confectionne ses compositions florales avec des bulbes de fleurs qu'elle reçoit en grande quantité. Chaque bulbe peut présenter deux défauts que l'on désigne par défaut a et défaut b .

On prélève un bulbe au hasard dans un stock important.

On note A l'évènement : « le bulbe présente le défaut a » et on note B l'évènement : « le bulbe présente le défaut b ».

On admet que les probabilités des évènements A et B sont $P(A) = 0,015$ et $P(B) = 0,02$.

On suppose que les deux évènements A et B sont indépendants

On admettra que si A et B sont indépendants alors A, B, \bar{A}, \bar{B} sont indépendants deux à deux

- i. Calculer la probabilité de l'évènement E_1 : « le bulbe présente le défaut a et le défaut b ».

$$A \text{ et } B \text{ sont indépendants donc } p(A \cap B) = p(A) \times p(B) = 0,015 \times 0,02 = \boxed{0,0003}$$

- ii. Calculer la probabilité de l'évènement E_2 ; « le bulbe présente au moins un des deux défauts ».

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) + p(A \cap B) = 0,015 + 0,02 - 0,0003 = \boxed{0,0347}$$

- iii. Calculer la probabilité de l'évènement E_3 : « le bulbe ne présente aucun des deux défauts ».

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = p(\bar{A}) \times p(\bar{B}) = (1 - 0,015) \times (1 - 0,02) = \boxed{0,9653} \text{ car } \bar{A} \text{ et } \bar{B} \text{ sont indépendants}$$

ou bien

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - p(A \cup B) = 1 - 0,353 = 0,9653$$

- iv. Calculer la probabilité de l'évènement E_4 : « le bulbe présente exactement un des deux défauts ».

$$p([\bar{A} \cap B] \cup [A \cap \bar{B}]) = p(\bar{A} \cap B) + p(A \cap \bar{B}) - p([\bar{A} \cap B] \cap [A \cap \bar{B}])$$

$$p([\bar{A} \cap B] \cup [A \cap \bar{B}]) = p(\bar{A}) \times p(B) + p(A) \times p(\bar{B}) - 0 \text{ (}\bar{A} \text{ et } B \text{ indépendants ainsi que } \bar{B} \text{ et } A\text{)}$$

$$p([\bar{A} \cap B] \cup [A \cap \bar{B}]) = (1 - 0,015) \times 0,02 + 0,015 \times (1 - 0,02) = \boxed{0,0344}$$

- v. $p(E_1) + p(E_3) + p(E_4) = 0,003 + 0,9653 + 0,0344 = \boxed{1}$

corrigé exercice 10 :

(D'après sujet bac France Métropolitaine, La Réunion Septembre 2007)


Jean s'amuse régulièrement sur un terrain de football avec le gardien de but. Chaque partie consiste à tirer successivement deux tirs au but.

Au vu des résultats obtenus au cours de l'année, on admet que :

- la probabilité que Jean réussisse le premier tir au but est égal à 0,8 ;
- s'il réussit le premier, alors la probabilité de réussir le second est 0,7 ;
- s'il manque le premier, alors la probabilité de réussir le second est 0,5.

On note R_1 l'évènement : « le premier tir au but est réussi » et $\overline{R_1}$ son évènement contraire, R_2 l'évènement : « le second tir au but est réussi » et $\overline{R_2}$ son évènement contraire.

(a) Représenter la situation par un arbre pondéré.



(b) Calculer la probabilité que les deux tirs au but soient réussis.

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1) \times P_{R_1}(R_2) = 0,8 \times 0,7 = 0,56$$

(c) i. Calculer la probabilité que le second tir au but soit réussi.

$$P(R_2) = P(R_1 \cap R_2) + P(\overline{R_1} \cap R_2)$$

$$P(R_2) = 0,8 \times 0,7 + 0,2 \times 0,5 = 0,66$$

ii. Les évènements R_1 et R_2 sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

$$\text{On a : } P(R_1) = 0,8 \text{ et } P(R_2) = 0,66$$

$$\text{d'où : } P(R_1) \times P(R_2) = 0,8 \times 0,66 = 0,528.$$

$$\text{de plus, } P(R_1 \cap R_2) = 0,56$$

$$\text{donc } P(R_1 \cap R_2) \neq P(R_1) \times P(R_2),$$

donc les évènements R_1 et R_2 ne sont pas indépendants

(d) On note A l'évènement : « Jean a réussi exactement un tir au but ». Montrer que $p(A) = 0,34$.

$$P(A) = P(\overline{R_1} \cap R_2) + P(R_1 \cap \overline{R_2}) = 0,2 \times 0,5 + 0,8 \times 0,3 = 0,34$$

4 adéquate à une loi équirépartie

4.1 activité

activité 1 :

On cherche à savoir si une pièce de monnaie est bien équilibrée.

Pour cela :

- On simule sur un ordinateur 2000 séries de 20 lancers (*par exemple*) avec une pièce idéale bien équilibrée pour laquelle la probabilité de faire pile vaut $\frac{1}{2}$ et celle de faire face vaut aussi $\frac{1}{2}$.

- Pour chacune des 2000 séries on calcule l'indicateur d^2 suivant : $d^2 = \left(\frac{1}{2} - f_p\right)^2 + \left(\frac{1}{2} - f_f\right)^2$

où f_p et f_f sont les fréquences respectives de piles et de faces

d^2 est d'autant plus petit que la pièce est bien équilibrée

d^2 est d'autant plus grand que la pièce est mal équilibrée

- On analyse statistiquement les 2000 valeurs de $1000d^2$ obtenues (*par commodité, on multiplie d^2 par 1000*)

$1000d^2$	[0; 5[[5; 20[[20; 45[[45; 80[[80; 125[[125; 180[[180; 500[total
fréquence	0,17	0,32	0,24	0,15	0,07	0,03	0,02	1

(*par exemple : 17% des 2000 valeurs de $1000d^2$ sont dans l'intervalle [0; 5[*)

- On lance 20 fois la pièce à tester :

	pile	face	total
effectif	7	13	20
fréquence	0,35	0,65	1

(a) calculer $d_{obs}^2 = \left(\frac{1}{2} - f_p\right)^2 + \left(\frac{1}{2} - f_f\right)^2$

(b) expliquer pourquoi la valeur de d_{obs}^2 permet de dire que comparativement à la pièce idéale, la pièce testée est bien équilibrée avec un risque de 2%

activité 2 :

Une clinique dispose des statistiques suivantes sur 1000 naissances relevées selon le jour de la semaine.

jour	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	total
rang du jour	1	2	3	4	5	6	7	
nombre de naissances	146	163	158	156	156	116	105	1000

Pour tout entier i compris entre 1 et 7 on note f_i la fréquence de naissance le i^e jour de la semaine.

On cherche à tester l'hypothèse H : « les naissances sont équiréparties le long de la semaine ».

(a) calculer

$$d_{obs}^2 = \sum_{i=1}^{i=7} \left(\frac{1}{7} - f_i\right)^2 \text{ puis donner la valeur arrondie à } 10^{-2} \text{ près de } 1000d_{obs}^2.$$

(b) on simule sur ordinateur, 5000 séries de 1000 naissances équiréparties sur les 7 jours de la semaine. Pour chacune des 5000 séries, l'ordinateur a calculé $1000d^2$ et on a les informations suivantes sur la répartition des valeurs de $1000d^2$:

$$D_1 = 0,2; Q_1 = 0,4; Q_2 = 0,6; Q_3 = 1,4 \text{ et } D_9 = 2,2.$$

Avec un risque d'erreur de 10%, peut-on considérer que le nombre de naissances est indépendant du jour de la semaine? (*justifier clairement*)

4.2 corrigé activité

corrigé activité 1 :

On cherche à savoir si une pièce de monnaie est bien équilibrée.

Pour cela :

- On simule sur un ordinateur 2000 séries de 20 lancers (*par exemple*) avec une pièce idéale bien équilibrée pour laquelle la probabilité de faire pile vaut $\frac{1}{2}$ et celle de faire face vaut aussi $\frac{1}{2}$.

- Pour chacune des 2000 séries on calcule l'indicateur d^2 suivant : $d^2 = \left(\frac{1}{2} - f_p\right)^2 + \left(\frac{1}{2} - f_f\right)^2$

où f_p et f_f sont les fréquences respectives de piles et de faces

d^2 est d'autant plus petit que la pièce est bien équilibrée

d^2 est d'autant plus grand que la pièce est mal équilibrée

- On analyse statistiquement les 2000 valeurs de $1000d^2$ obtenues (*par commodité, on multiplie d^2 par 1000*)

$1000d^2$	$[0; 5[$	$[5; 20[$	$[20; 45[$	$[45; 80[$	$[80; 125[$	$[125; 180[$	$[180; 500[$	total
fréquence	0,17	0,32	0,24	0,15	0,07	0,03	0,02	1

(*par exemple : 17% des 2000 valeurs de $1000d^2$ sont dans l'intervalle $[0; 5[$*)

- On lance 20 fois la pièce à tester :

	pile	face	total
effectif	7	13	20
fréquence	0,35	0,65	1

(a) $d_{obs}^2 = \left(\frac{1}{2} - f_p\right)^2 + \left(\frac{1}{2} - f_f\right)^2$

$$d_{obs}^2 = \left(\frac{1}{2} - 0,35\right)^2 + \left(\frac{1}{2} - 0,65\right)^2$$

$$d_{obs}^2 = 0,045$$

(b) expliquer pourquoi la valeur de d_{obs}^2 permet de dire que comparativement à la pièce idéale, la pièce testée est bien équilibrée avec un risque de 2%

on a : $d_{obs}^2 = 0,045$ donc $1000d_{obs}^2 = 1000 \times 0,045 = 45$

or, d'après le tableau d'analyse des 2000 valeurs de $1000d^2$ simulées pour la pièce "idéale" on constate que :

- 2% des 2000 valeurs sont supérieures ou égales à 180 (événement "rare")

- 98% des 2000 valeurs sont inférieures ou égales à 180 (événement "non rare")

donc, la valeur $1000d_{obs}^2 = 45$ avec $45 < 180$ permet de dire que :

la pièce testée est bien équilibrée avec un risque de 2%

corrigé activité 2 :

Une clinique dispose des statistiques suivantes sur 1000 naissances relevées selon le jour de la semaine.

jour	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	total
rang du jour	1	2	3	4	5	6	7	
nombre de naissances	146	163	158	156	156	116	105	1000

Pour tout entier i compris entre 1 et 7 on note f_i la fréquence de naissance le i^e jour de la semaine. On cherche à tester l'hypothèse H : « les naissances sont équiréparties le long de la semaine ».

(a) calculer

$$d_{obs}^2 = \sum_{i=1}^{i=7} \left(\frac{1}{7} - f_i\right)^2 \text{ puis donner la valeur arrondie à } 10^{-2} \text{ près de } 1000d_{obs}^2$$

$$d_{obs}^2 = \left(\frac{1}{7} - \frac{146}{1000}\right)^2 + \left(\frac{1}{7} - \frac{163}{1000}\right)^2 + \left(\frac{1}{7} - \frac{158}{1000}\right)^2 + \left(\frac{1}{7} - \frac{156}{1000}\right)^2 + \left(\frac{1}{7} - \frac{156}{1000}\right)^2 + \left(\frac{1}{7} - \frac{116}{1000}\right)^2 + \left(\frac{1}{7} - \frac{105}{1000}\right)^2$$

$$d_{obs}^2 \simeq 0,0314$$

$$1000d_{obs}^2 \simeq 3,14$$

(b) on simule sur ordinateur, 5000 séries de 1000 naissances équiréparties sur les 7 jours de la semaine. Pour chacune des 5000 séries, l'ordinateur a calculé $1000d^2$ et on a les informations suivantes sur la répartition des valeurs de $1000d^2$:

$$D_1 = 0,2; Q_1 = 0,4; Q_2 = 0,6; Q_3 = 1,4 \text{ et } D_9 = 2,2.$$

Avec un risque d'erreur de 10%, peut-on considérer que le nombre de naissances est indépendant du jour de la semaine? (*justifier clairement*)

$$\text{on a : } 1000d_{obs}^2 \simeq 3,14$$

or, l'analyse des 5000 valeurs de $1000d^2$ simulées pour les naissances équiréparties, on constate que :

- 10% des 5000 valeurs sont supérieures ou égales à 2,2 (événement "rare")
- 90% des 5000 valeurs sont inférieures ou égales à 2,2 (événement "non rare")

donc, la valeur $1000d_{obs}^2 = 3,14$ avec $2,2 < 3,14$ permet de dire que :

$$\boxed{\text{le nombre de naissances n'est pas indépendant du jour de la semaine au risque d'erreur de 10\%}}$$

4.3 à retenir

définition 2:

Soit un univers de probabilité $U = \{x_1; x_2; \dots; x_n\}$ constitué de $n > 0$ éventualités

On dit qu' : il y a équipartition si et seulement si chaque éventualité x_i a pour probabilité $\frac{1}{n}$

Remarques :

(a) toutes les éventualités ont la même probabilité

test de l'équirépartition

Soit une expérience aléatoire E d'univers $U = \{x_1; x_2; \dots; x_n\}$ constitué de $n > 0$ éventualités

- dans le cas de l'équirépartition, on simule sur ordinateur, k série de p expériences avec k et p "assez grand"
- pour chacune des k séries précédentes on calcule l'indicateur :

$$d^2 = \sum_{j=1}^{j=n} \left(\frac{1}{n} - f_j \right)^2 \text{ où } f_j \text{ est la fréquence d'apparition de l'éventualité } x_j$$

- on réalise une étude statistique de la répartition des valeurs de d^2 obtenues pour laquelle on obtient par exemple le neuvième décile D_9

- on réalise une série de p expérience E , série pour laquelle on calcule l'indicateur : $d_{obs}^2 = \sum_{j=1}^{j=n} \left(\frac{1}{n} - f_j \right)^2$

- on compare la valeur de d_{obs}^2 avec la valeur de D_9 précédente

si $d_{obs}^2 \leq D_9$ on dit qu'il y a équirépartition avec un risque de 10%

Remarques :

(a) si $d_{obs}^2 > D_9$ on dit qu'il n'y a pas équirépartition avec un risque de 10%

(b) ce principe est valable pour D_8 ou Q_3 ou tout autre centile

4.4 exercices

exercice 11 :

(D'après sujet bac Amérique du Nord 2009)

Un pépiniériste a planté trois variétés de fleurs dans une prairie de quelques hectares : des violettes, des primevères et des marguerites. Il se demande s'il peut considérer que sa prairie contient autant de fleurs de chaque variété. Il cueille au hasard 500 fleurs et obtient les résultats suivants :

Variétés	Violettes	Primevères	Marguerites
Effectifs	179	133	188

(a) Calculer les fréquences f_V d'une fleur de variété Violette, f_P d'une fleur de variété Primevère et f_M d'une fleur de variété Marguerite. On donnera les valeurs décimales exactes.

(b) On note $d_{\text{obs}}^2 = \left(f_V - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(f_P - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(f_M - \frac{1}{3}\right)^2$.

Calculer $500d_{\text{obs}}^2$. On donnera une valeur approchée arrondie au millième.

(c) Le pépiniériste, ne voulant pas compter les quelques milliards de fleurs de sa prairie, opère sur ordinateur en simulant le comptage, au hasard, de 500 fleurs suivant la loi équirépartie. Il répète 2000 fois l'opération et calcule à chaque fois la valeur de $500d_{\text{obs}}^2$. Ses résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

Intervalle auquel appartient $500d_{\text{obs}}^2$	$[0; 0, 5[$	$[0, 5; 1[$	$[1; 1, 5[$	$[1, 5; 2[$	$[2; 2, 5[$	$[2, 5; 3[$	$[3; 3, 5[$	$[3, 5; 4[$	$[4; 4, 5[$	$[4, 5; 5[$
Nombre par intervalle	163	439	458	350	231	161	80	47	37	34

Par exemple : le nombre $500d_{\text{obs}}^2$ apparaît 163 fois dans l'intervalle $[0 ; 0, 5[$.

On note D_9 le neuvième décile de cette série statistique.

Montrer que $D_9 \in [2, 5 ; 3[$.

(d) En argumentant soigneusement la réponse, dire si pour la série observée au début, on peut affirmer avec un risque inférieur à 10 % que « la prairie est composée d'autant de fleurs de chaque variété ».

Un pisciculteur possède un bassin qui contient trois variétés de truites : communes, saumonées et arc-en-ciel. Il voudrait savoir s'il peut considérer que son bassin contient autant de truites de chaque variété. Pour cela il effectue, au hasard, 400 prélèvements d'une truite avec remise et obtient les résultats suivants :

Variété	Commune	Saumonée	Arc-en-ciel
Effectifs	146	118	136


- (a) i. Calculer les fréquences de prélèvement f_c d'une truite commune, f_s d'une truite saumonée et f_a d'une truite arc-en-ciel. On donnera les valeurs décimales exactes.

ii. On pose $d^2 = \left(f_c - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(f_s - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(f_a - \frac{1}{3}\right)^2$.

Calculer $400d^2$ arrondi à 10^{-2} ; on note $400d_{\text{obs}}^2$ cette valeur.

À l'aide d'un ordinateur, le pisciculteur simule le prélèvement au hasard de 400 truites suivant la loi équirépartie. Il répète 1 000 fois cette opération et calcule à chaque fois la valeur de $400d^2$.

Le diagramme à bandes ci-dessous représente la série des 1 000 valeurs de $400d^2$, obtenues par simulation.



- (b) Déterminer une valeur approchée à 0,5 près par défaut, du neuvième décile D9 de cette série.
- (c) En argumentant soigneusement la réponse dire si on peut affirmer avec un risque d'erreur inférieur à 10 % que « le bassin contient autant de truites de chaque variété ».
- (d) On considère désormais que le bassin contient autant de truites de chaque variété. Quand un client se présente, il prélève au hasard une truite du bassin.

Trois clients prélèvent chacun une truite. Le grand nombre de truites du bassin permet d'assimiler ces prélèvements à des tirages successifs avec remise.

Calculer la probabilité qu'un seul des trois clients prélève une truite commune.

4.5 correction exercices

corrigé exercice 11 :

(D'après sujet bac Amérique du Nord 2009)

Un pépiniériste a planté trois variétés de fleurs dans une prairie de quelques hectares : des violettes, des primevères et des marguerites. Il se demande s'il peut considérer que sa prairie contient autant de fleurs de chaque variété. Il cueille au hasard 500 fleurs et obtient les résultats suivants :

Variétés	Violettes	Primevères	Marguerites
Effectifs	179	133	188

- (a) Calculer les fréquences f_V d'une fleur de variété Violette, f_P d'une fleur de variété Primevère et f_M d'une fleur de variété Marguerite. On donnera les valeurs décimales exactes.

$$f_V = \frac{179}{500} = 0,358 \quad f_P = \frac{133}{500} = 0,266 \quad f_M = \frac{188}{500} = 0,376$$

(b) $d_{\text{obs}}^2 = \left(f_V - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(f_P - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(f_M - \frac{1}{3}\right)^2$

$$d_{\text{obs}}^2 = \left(0,358 - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(0,266 - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(0,376 - \frac{1}{3}\right)^2$$

$$500d_{\text{obs}}^2 \simeq 3,481 \text{ arrondie au millième}$$

- (c) Le pépiniériste, ne voulant pas compter les quelques milliards de fleurs de sa prairie, opère sur ordinateur en simulant le comptage, au hasard, de 500 fleurs suivant la loi équirépartie. Il répète 2000 fois l'opération et calcule à chaque fois la valeur de $500d_{\text{obs}}^2$. Ses résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

Intervalle auquel appartient $500d_{\text{obs}}^2$	$[0; 0,5[$	$[0,5; 1[$	$[1; 1,5[$	$[1,5; 2[$	$[2; 2,5[$	$[2,5; 3[$	$[3; 3,5[$	$[3,5; 4[$	$[4; 4,5[$	$[4,5; 5[$
Nombre par intervalle	163	439	458	350	231	161	80	47	37	34

Par exemple : le nombre $500d_{\text{obs}}^2$ apparaît 163 fois dans l'intervalle $[0 ; 0,5[$.

On note D_9 le neuvième décile de cette série statistique.

Montrer que $D_9 \in [2,5 ; 3[$.

D_9 est la plus petite valeur de la série telle que au moins 90% des valeurs de la série soient inférieures ou égales à D_9 :

or : $\frac{163 + 439 + 458 + 350 + 231}{500} = 0,8205 = 82,05\% (<90\%)$ des valeurs sont inférieures à 2,5

et : $\frac{163 + 439 + 458 + 350 + 231 + 161}{500} = 0,901 = 90,1\% (>90\%)$ des valeurs sont inférieures à 3

donc : $D_9 \in [2,5 ; 3[$

- (d) En argumentant soigneusement la réponse, dire si pour la série observée au début, on peut affirmer avec un risque inférieur à 10 % que « la prairie est composée d'autant de fleurs de chaque variété ».

d'après l'analyse des 2000 valeurs de $500d^2$ simulées pour l'équirépartition, on constate que :

- 9,9% des 2000 valeurs sont supérieures ou égales à 3 (événement "rare")
- 90,1% des 2000 valeurs sont inférieures ou égales à 3 (événement "non rare")

donc, la valeur $500d_{\text{obs}}^2 \simeq 3,481$ avec $3 < 3,481$ permet de dire que :

la prairie n'est pas composée d'autant de fleurs de chaque variété avec un risque de 9,9% inférieur à 10 %

Un pisciculteur possède un bassin qui contient trois variétés de truites : communes, saumonées et arc-en-ciel. Il voudrait savoir s'il peut considérer que son bassin contient autant de truites de chaque variété. Pour cela il effectue, au hasard, 400 prélèvements d'une truite avec remise et obtient les résultats suivants :

Variété	Commune	Saumonée	Arc-en-ciel
Effectifs	146	118	136


(a) i. $f_c = \frac{146}{400} = 0,365$ $f_s = \frac{118}{400} = 0,295$ $f_a = \frac{136}{400} = 0,34$

ii. $d^2 = \left(f_c - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(f_s - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(f_a - \frac{1}{3}\right)^2$
 $d^2 = \left(0,365 - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(0,295 - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(0,34 - \frac{1}{3}\right)^2$

$400d_{\text{obs}}^2 \simeq 1,01$ arrondi à 10^{-2}

À l'aide d'un ordinateur, le pisciculteur simule le prélèvement au hasard de 400 truites suivant la loi équirépartie. Il répète 1 000 fois cette opération et calcule à chaque fois la valeur de $400d^2$.

Le diagramme à bandes ci-dessous représente la série des 1 000 valeurs de $400d^2$, obtenues par simulation.



(b) Déterminer une valeur approchée à 0,5 près par défaut, du neuvième décile D_9 de cette série.

D_9 est la plus petite valeur de la série telle que

au moins 90% des 1000 valeurs de la série soient inférieurs ou égaux à D_9 : $(90\% \times 1000 = 900)$

or : $\frac{539 + 235 + 122}{1000} = 0,896 = 89,6\% (<90\%)$ donc $D_9 > 1,5$

et : $\frac{539 + 235 + 122 + 51}{1000} = 0,947 = 94,7\% (>90\%)$ donc $D_9 < 2$

donc : $D_9 = 1,5$ à 0,5 près par défaut

(c) En argumentant soigneusement la réponse dire si on peut affirmer avec un risque d'erreur inférieur à 10 % que « le bassin contient autant de truites de chaque variété ».

$400d_{\text{obs}}^2 \simeq 1,01$ et $1,01 < D_9$ ($1,01 < 1,5$)

donc avec un risque d'erreur inférieur à 10 % « le bassin contient autant de truites de chaque variété »

(d) On considère désormais que le bassin contient autant de truites de chaque variété. Quand un client se présente, il prélève au hasard une truite du bassin.

Trois clients prélèvent chacun une truite. Le grand nombre de truites du bassin permet d'assimiler ces prélèvements à des tirages successifs avec remise.


Calculer la probabilité qu'un seul des trois clients prélève une truite commune.

nous sommes en présence d'une loi binomiale car :

{	il y a 3 tirages	{	succès : "la truite est commune" $\frac{1}{3}$
	les 3 tirages sont indépendants		échec : "la truite n'est pas commune" $\frac{2}{3}$
	pour chaque tirage, il n'y a que deux issues possibles		

on cherche la probabilité $p(X = 1)$ où X est le nombre de truites communes parmi les trois truites choisies au hasard

on fait un arbre de probabilités :



$p(X = 1) = 3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^1 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{12}{27} \simeq \boxed{44,4\%}$ de chance qu'un seul des trois clients prenne une truite commune

5 devoir maison

Corrigé devoir maison probabilités.

Exercice 52 p 130

On sait que $p(A) = 0,2$, $p(B) = 0,7$ et $p(A \cup B) = 0,76$.

Démontrons que A et B sont indépendants.

Propriété : $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

donc

$$0,76 = 0,2 + 0,7 - p(A \cap B)$$

donc

$$p(A \cap B) = 0,2 + 0,7 - 0,76 = 0,14$$

d'une part : $p(A \cap B) = 0,14$ d'autre part : $p(A) \times p(B) = 0,2 \times 0,7 = 0,14$.

donc

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$$

donc A et B sont indépendants.

Exercice 57 p 131

$$1. \quad a. \quad p(C) = \frac{100 + 250 + 150}{100 + 250 + 150 + 300 + 550 + 650} = \frac{500}{2000} = 0,25$$

$$p(I) = \frac{100 + 300}{100 + 250 + 150 + 300 + 550 + 650} = \frac{400}{2000} = 0,2$$

$$b. \quad \text{d'une part : } p(I \cap C) = \frac{100}{2000} = 0,05 \quad \text{d'autre part : } p(I) \times p(C) = 0,25 \times 0,2 = 0,05.$$

donc

$$p(I \cap C) = p(I) \times p(C)$$

donc I et C sont indépendants.

$$2. \quad a. \quad p_E(C) = \frac{100 + 250}{100 + 250 + 300 + 550} = \frac{350}{1200} = \frac{7}{24}$$

$$b. \quad p_C(E) = \frac{100 + 250}{100 + 250 + 150} = \frac{350}{500} = 0,7$$

$$c. \quad p_C(M) = 1 - 0,7 = 0,3$$


Exercice 61 p 131

$$1. \quad a. \quad \text{On sait que } O \text{ et } \bar{D} \text{ sont indépendants donc } p(\bar{D} \cap O) = p(\bar{D}) \times p(O) = 0,5 \times 0,2 = 0,1$$

$$b. \quad \text{On sait que } \bar{O} \text{ et } D \text{ sont indépendants donc } p(D \cap \bar{O}) = p(D) \times p(\bar{O}) = 0,8 \times 0,5 = 0,4$$

$$c. \quad p(E) = p(\bar{D} \cap O) + p(D \cap \bar{O}) = 0,1 + 0,4 = 0,5$$

$$2. \quad a. \quad \text{On sait que } p_D(O) = 0,9 \text{ et } p_{\bar{D}}(O) = 0,1$$



$$b. p(E) = p(\overline{D} \cap O) + p(D \cap \overline{O}) = (1 - p) \times 0,1 + p \times 0,1 = 0,1$$

$$c. p(O) = p(\overline{D} \cap O) + p(D \cap \overline{O}) = p \times 0,9 + (1 - p) \times 0,1 = 0,8p + 0,1$$

$$d. p_O(D) = \frac{p(D \cap O)}{p(O)} = \frac{0,9p}{0,8p + 0,1}$$

$$\frac{0,9p}{0,8p + 0,1} \geq 0,9 \iff \frac{0,9p}{0,8p + 0,1} - 0,9 \geq 0 \iff \frac{0,9p}{0,8p + 0,1} - \frac{0,9(0,8p + 0,1)}{0,8p + 0,1} \geq 0$$


$$\iff \frac{0,9p - 0,72p - 0,09}{0,8p + 0,1} \geq 0 \iff \frac{0,18p - 0,09}{0,8p + 0,1} \geq 0$$

$$\iff 0,18p - 0,09 \geq 0 \text{ (car } 0,8p + 0,1 > 0)$$

$$\iff p \geq \frac{0,09}{0,18}$$

$$\iff p \geq 0,5$$

Ce qui signifie que : la probabilité qu'un sportif ayant été déclaré positif soit réellement dopé dépasse 90% si et seulement si la probabilité qu'un sportif soit dopé dépasse 50%.



2. $p(H \cap S) = p(H) \times p_H(S) = 0,48 \times 0,34 \quad \boxed{p(H \cap S) = 0,1632}$

3. $p(S) = p(F \cap S) + p(H \cap S) = 0,1612 + 0,1632 \quad \boxed{p(S) = 0,3244}$

4. $p_S(F) = \frac{p(S \cap F)}{p(S)} = \frac{0,1612}{0,3244} \quad \boxed{p_S(F) \simeq 0,497 \text{ à } 10^{-3} \text{ près}}$

5. $X =$ nombre de réponses favorables, suit une loi binomiale $B(n = 3; p = 0,3244)$

car $\left\{ \begin{array}{l} \bullet \text{ il y a 3 tirages identiques} \\ \bullet \text{ les tirages sont indépendants} \\ \bullet \text{ pour chaque tirage, il n'y a que deux issues possibles} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{succès : } 0,3244 \\ \text{échec : } 1-0,3244=0,6756 \end{array} \right.$

6. $p(X \geq 2) = p(X = 2) + p(X = 3)$

$$p(X \geq 2) = \binom{3}{2} \times 0,3244^2 \times 0,6756^1 + \binom{3}{3} \times 0,3244^3 \times 0,6756^0$$

$\boxed{p(X \geq 2) \simeq 0,2744}$

6 évaluation

6.1 évaluation 1

nom, prénom : ...

Exercice 1 : cocher la bonne réponse et barrer les autres

1. quelle est la bonne formule quels que soient A et B ?

$p(A \cup B) = p(A) + p(B)$	$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$	$p(A \cup B) = 1 - p(A \cap B)$
-----------------------------	---	---------------------------------

2. quelle est la bonne formule ?

$p_B(A) = \frac{p(A \cup B)}{p(A)}$	$p_B(A) = \frac{p(B \cap A)}{p(B)}$	$p_A(B) = \frac{p(A \cup B)}{p(A)}$	$p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

3. quelle est la bonne formule ?

$p(A) = 1 + p(\bar{A})$	$p(A) = p(\bar{A}) - 1$	$p(A) + p(\bar{A}) = 1$	$p(\bar{A}) = p(A) - 1$
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

4. quelle est la bonne formule ?

$p(A \cap B) = p(B) \times p_B(A)$	$p(A \cap B) = p(B) \times p_A(B)$	$p(A \cap B) = p(B) \times p(A)$
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

5. si C et D réalisent une partition de l'univers, quelle est la bonne formule ?

$p(A) = p(C \cup A) + p(D \cup A)$	$p(A) = p(C \cap A) + p(D \cap A)$	$p(A) = p(C \cap A) + p(D \cap C)$
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Exercice 2 :

un test est réalisé sur l'efficacité d'un vaccin. 2000 personnes participent au test. Les résultats sont résumés dans le tableau suivant. On choisit une personne au hasard parmi les 2000 personnes en supposant qu'il y a équiprobabilité. V signifie "vaccinée" et M signifie "tombée malade"

	vacciné	non vacciné	total
malade	240	360	600
non malade	960	440	1400
total	1200	800	2000

- calculer la probabilité $p_V(M)$ par deux méthodes et interpréter le résultat
- calculer la probabilité $p_{\bar{V}}(M)$ par deux méthodes et interpréter le résultat
- le vaccin semble t-il efficace ? (*justifier*)

Exercice 3 :

un dé à six faces n'est pas bien équilibré, un échantillonnage a permis d'obtenir le tableau suivant

score X	1	2	3	4	5	6	total
fréquence	0,2	0,1	0,05	0,5	0,05	0,1	1

- calculer $p_{PAIR}(X \leq 4)$ à 0,01 près
- avec ce dé, est-il plus probable de faire un score d'au plus 4 points si le score est pair ou s'il est impair ? (*justifier*)

exercice 4 :

on dispose des données suivantes concernant une classe

$$p(S \cap G) = 0,15; p(S \cap F) = 0,6; p(F) = 0,8$$

où S signifie "sportif", G signifie "garçons" et F signifie "fille"

- calculer $p_G(S)$; $p_F(S)$ et interpréter
- en déduire $p(S)$
- est-il plus probable de trouver un sportif parmi les filles ou parmi les garçons ? (*justifier*)

6.2 corrigé évaluation 1

nom, prénom : ...

Exercice 1 : cocher la bonne réponse et barrer les autres

1. la bonne formule quels que soient A et B

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

2. la bonne formule

$$p_B(A) = \frac{p(B \cap A)}{p(B)}$$

3. la bonne formule

$$p(A) + p(\bar{A}) = 1$$

4. la bonne formule

$$p(A \cap B) = p(B) \times p_B(A)$$

5. C et D réalisent une partition de l'univers, la bonne formule

$$p(A) = p(C \cap A) + p(D \cap A)$$

Exercice 2 :

	vacciné	non vacciné	total
malade	240	360	600
non malade	960	440	1400
total	1200	800	2000

1. $p_V(M) = \frac{240}{1200} = 0,2$ ou bien $p_V(M) = \frac{p(V \cap M)}{p(V)} = \frac{240}{1200} = 0,2$

la probabilité de tomber sur un malade sachant que la personne est vaccinée est de 20%

2. $p_{\bar{V}}(M) = \frac{360}{800} = 0,45$ ou bien $p_{\bar{V}}(M) = \frac{p(\bar{V} \cap M)}{p(\bar{V})} = \frac{360}{800} = 0,45$

la probabilité de tomber sur un malade sachant que la personne n'est pas vaccinée est de 45%

3. le vaccin ne semble pas efficace car $45\% > 20\%$ il est plus probable de trouver un malade parmi les non vaccinés que parmi les vaccinés

Exercice 3 :

score X	1	2	3	4	5	6	total
fréquence	0,2	0,1	0,05	0,5	0,05	0,1	1

1. $p_{PAIR}(X \leq 4) = \frac{p(X_{PAIR} \cap X \leq 4)}{p(PAIR)} = \frac{p(2) + p(4)}{p(2) + p(4) + p(6)} = \frac{0,1 + 0,5}{0,1 + 0,5 + 0,1} = \frac{0,6}{0,7} \approx 0,86$

2. $p_{IMPAIR}(X \leq 4) = \frac{p(X_{IMPAIR} \cap X \leq 4)}{p(IMPAIR)} = \frac{p(1) + p(3)}{p(1) + p(3) + p(5)} = \frac{0,2 + 0,05}{0,2 + 0,05 + 0,05} = \frac{0,25}{0,3} \approx 0,83$

$0,86 > 0,83$ donc, il est plus probable de faire un score d'au plus 4 points si le score est pair

exercice 4 :

1. $p_G(S) = \frac{p(G \cap S)}{p(G)} = \frac{0,15}{1 - 0,8} = 0,75$

sachant qu'il est garçon, la probabilité que l'élève soit sportif est de 75%

$$p_F(S) = \frac{p(F \cap S)}{p(F)} = \frac{0,6}{0,8} = 0,75$$

sachant que c'est une fille, la probabilité que l'élève soit sportive est de 75%

2. $p(S) = p(S \cap G) + p(S \cap F) = 15\% + 60\% = 75\%$

la probabilité qu'un élève de cette classe soit sportif est de 75%

3. même probabilité de 75% de trouver un sportif parmi les filles ou parmi les garçons